


**FREKUENSI ULSER RONGGA MULUT PADA  
PENDERITA TUBERKULOSIS ( TBC ) PARU  
RAWAT INAP DI BANGSAL PARU RSUD DR. SOETOMO  
SURABAYA**

**( OBSERVASI KLINIK )**

**SKRIPSI**



**DWI ANDRIANI**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**FREKUENSI ULSER RONGGA MULUT PADA  
PENDERITA TUBERKULOSIS ( TBC ) PARU  
RAWAT INAP DI BANGSAL PARU RSUD DR. SOETOMO  
SURABAYA**

**( OBSERVASI KLINIK )**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menyelesaikan pendidikan dokter gigi  
Pada Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga  
Surabaya**

*Oleh :*

**DWI ANDRIANI  
029812563**

**Mengetahui / Menyetujui :**

**Pembimbing I**

  
**( Bagus S., drg, MHPEd, SpPM )**

**NIP. 130 695 879**

**Pembimbing II**

  
**( Isidora K., drg, MS, SpPM )**

**NIP. 130 701 118**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah :

Dari 22 penderita tuberkulosis paru rawat inap di bangsal paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya, didapatkan 1 penderita dengan ulser rongga mulut.

Saran :

Meskipun kelainan rongga mulut pada penderita tuberkulosis paru sangat jarang, dianjurkan agar dokter gigi tetap meningkatkan kewaspadaan dalam mengidentifikasi lesi ulser rongga mulut penderita yang disertai penyakit sistemik, sehingga diharapkan dokter gigi dapat menegakkan diagnosa dengan tepat.